



المعامل:	9	الرىاضىاء	المادة:
مءة الإنجاز:	4س	شعبة العلوم الرىاضىة (أ) و (ب)	الشعب (ة):

بسمء باسئعمال الآلة الحاسبىة

الئمرىن الأول: (3,5 نطء)

المسئوى العقءى منسوب إلى معلم مئعامء مسنظم مباءر  $(O, \bar{u}, \bar{v})$ .

نءبر الئطبىق  $r$  الذى ىربط النطءة  $M(z)$  بالنطءة  $M_1(z_1)$  حىء:  $z_1 = \frac{1+\sqrt{3}i}{2}z + \frac{\sqrt{3}+i}{2}$

و الئطبىق  $h$  الذى ىربط النطءة  $M(z)$  بالنطءة  $M_2(z_2)$  حىء:  $z_2 = -2z + 3i$  و نضع  $F = h \circ r$

(1) حءء طبقىة كل من الئطبىقىن  $r$  و  $h$  وعناصرهما الممىزة.

(2) نءبر النطئئىن  $\Omega(i)$  و  $A(a)$  حىء  $a$  عءء عقءى معلوم مءالف للعدد  $i$ .

ونضع:  $B = F(A)$  و  $C = F(B)$  و  $D = F(C)$

(أ) بىن أنه إذا كانت النطءة  $M'(z')$  هى صورة النطءة  $M(z)$  بالئطبىق  $F$  فأن:

$$z' - i = 2e^{\frac{4\pi}{3}}(z - i)$$

(ب) ئءقق أن  $\Omega$  هى النطءة الوحىءة الئى ئءقق:  $F(\Omega) = \Omega$

(3) (أ) حءء بءلالة العءء العقءى  $a$  الأعداد العقءىة  $b$  و  $c$  و  $d$  الءاق النطء  $B$  و  $C$  و  $D$  على الئوالى.

(ب) بىن أن النطء  $\Omega$  و  $A$  و  $D$  مسئقىمىة.

(ج) بىن أن  $\Omega$  هو مرءء النظمة المئزنة  $\{(B, 4); (C, 2); (D, 1)\}$

(ء) حءء مءموعة النطء  $A(a)$  لكى ئكون النطءة  $D$  ئنئمى إلى المءور الحقىقى.

الئمرىن الئانى: (4 نطء)

نزوء المءموعة  $\mathbb{R}$  بقانون الئركىب الءاخلى \* المءرف بما ىلى:

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) ; x * y = x + y - 3xy$$

(1) (أ) ئءقق أن:  $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) ; (1 - 3x)(1 - 3y) = 1 - 3(x * y)$



(ب) بين أن  $\left(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}, *\right)$  زمرة تبادلية.

0,75ن

(2) (أ) بين أن التطبيق  $\varphi$  الذي يربط كل عدد حقيقي  $x$  بالعدد الحقيقي

0,5ن

$$\varphi(x) = 1 - 3x \quad \text{تشاكل تقابلي من } \left(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}, *\right) \text{ نحو } (\mathbb{R}^*, \times)$$

$$\text{(ب) بين أن : } \varphi^{-1}(\mathbb{R}_+^*) = \left]-\infty, \frac{1}{3}\right[$$

0,25ن

$$\text{(ج) بين أن } \left(\left]-\infty, \frac{1}{3}\right[, *\right) \text{ زمرة جزئية للزمرة } \left(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}, *\right)$$

0,5ن

(3) لكل  $x$  من المجموعة  $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}$  ولكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  نضع :  $x^{(0)} = 0$

$$\text{و } (\forall n \in \mathbb{N}) ; x^{(n+1)} = x^{(n)} * x$$

$$\text{(أ) بين أن : } \varphi(x^{(n)}) = (\varphi(x))^n ; (\forall n \in \mathbb{N}) ; \left(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}\right)$$

0,25ن

(ب) استنتج  $x^{(n)}$  بدلالة  $x$  و  $n$ .

0,5ن

(4) نزود المجموعة  $\mathbb{R}$  بقانون التركيب الداخلي  $T$  المعروف بما يلي :

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) ; xTy = x + y - \frac{1}{3}$$

(أ) بين أن :  $(\mathbb{R}, T)$  زمرة تبادلية.

0,5ن

(ب) بين أن :  $(\mathbb{R}, T, *)$  جسم تبادلي.

0,5ن

### التمرين الثالث: (5,2 نقط)

يحتوي صندوق على أربع كرات: كرة بيضاء و ثلاث كرات حمراء غير قابلة للتمييز باللمس .

نسحب عشوائيا كرة من الصندوق , نسجل لونها , ثم نعيدها إلى الصندوق.

نجري نفس التجربة لمرات متتابة إلى أن نحصل لأول مرة على كرتين متتابعتين من نفس اللون

و نوقف التجربة .

ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يساوي رتبة السحبة التي توقفت فيها التجربة.

(1) احسب احتمال كل حدث من الحدثين التاليين :  $[X = 2]$  و  $[X = 3]$

ان



(2) ليكن  $k$  عدد صحيح طبيعي غير منعدم.

أ) بين أن احتمال الحدث  $[X = 2k]$  هو  $p_{2k} = \frac{5}{8} \left( \frac{3}{16} \right)^{k-1}$  0,75 ن

ب) بين أن احتمال الحدث  $[X = 2k + 1]$  هو  $p_{2k+1} = \left( \frac{3}{16} \right)^k$  0,75 ن

التمرين الرابع: (10 نقط)

I- نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على المجال  $I = \left] -\frac{1}{2}, +\infty \right[$  بما يلي:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x} ; & x \neq 0 \\ f(0) = 2 \end{cases}$$

و ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة  $f$  في معلم متعامد ممنظم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) بين أن الدالة  $f$  متصلة في الصفر . 0,5

(2) لكل عدد حقيقي غير منعدم  $a$  من المجال I نعتبر الدالة العددية  $h_a$  للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة على

المجال I بما يلي:  $h_a(x) = (\ln(1+2a) - 2a)x^2 - (\ln(1+2x) - 2x)a^2$

أ) احسب  $h_a(a)$  و  $h_a(0)$  ثم استنتج أنه يوجد عدد حقيقي  $b$  محصور بين 0 و  $a$  بحيث:

$$\frac{\ln(1+2a) - 2a}{a^2} = \frac{-2}{1+2b}$$
 0,5

ب) استنتج أن الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق في الصفر و أن :  $f'(0) = -2$  . 0,75

(3) أ) بين أن الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق على المجال  $I \setminus \{0\}$  0,5

و أن :  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2(1+2x)}$  ;  $(\forall x \in I \setminus \{0\})$  حيث :  $g(x) = 2x - (1+2x)\ln(1+2x)$

ب) بين أن :  $g(x) < 0$  ;  $(\forall x \in I \setminus \{0\})$  0,5

ج) استنتج تغيرات الدالة  $f$  على المجال I . 0,25

أ) احسب النهايتين  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x)$  ثم أول هندسيا النتيجة المحصل عليهما. 0,5



(ب) بين أنه يوجد عدد حقيقي وحيد  $\alpha$  من المجال  $[1, 2]$  بحيث  $f(\alpha) = 1$

0,5

(ج) أنشئ المنحنى (C) (نأخذ :  $\alpha \approx 1,3$ )

0,5

II - (1) نضع :  $J = [1, \alpha]$  و  $\varphi(x) = \ln(1 + 2x)$  ( $\forall x \in I$ ) .

(أ) بين الدالة  $\varphi$  قابلة للاشتقاق على المجال I وأن :  $0 < \varphi'(x) \leq \frac{2}{3}$  ( $\forall x \geq 1$ )

0,5

(ب) تحقق أن :  $\varphi(\alpha) = \alpha$  و أن :  $\varphi(J) \subset J$

0,75

(2) نعتبر المتتالية العددية  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  المعرفة بما يلي :  $u_0 = 1$  و  $u_{n+1} = \ln(1 + 2u_n)$  ( $\forall n \geq 0$ )

(أ) بين أن :  $u_n \in J$  ( $\forall n \geq 0$ )

0,5

(ب) بين أن :  $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$  ( $\forall n \geq 0$ )

0,5

(ج) استنتج أن المتتالية  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  متقاربة و حدد نهايتها.

0,5

III - نعتبر الدالة العددية F المعرفة على المجال I بما يلي :  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$

(1) (أ) بين أن الدالة F قابلة للاشتقاق على المجال I ثم أحسب  $F'(x)$

0,5

(ب) استنتج منحي تغيرات الدالة F على المجال I .

0,25

(2) (أ) بين أن :  $F(x) \geq \int_1^x \frac{\ln(1+2t)}{1+2t} dt$  ( $\forall x \geq 1$ )

0,5

(ب) استنتج أن :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$

0,5

(3) نفترض أن الدالة F تقبل نهاية منتهية  $\ell$  على اليمين في  $-\frac{1}{2}$

$$\begin{cases} \tilde{F}(x) = F(x) ; x \in I \\ \tilde{F}\left(-\frac{1}{2}\right) = \ell \end{cases}$$

ونعتبر الدالة  $\tilde{F}$  المعرفة على المجال  $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$  بما يلي :

(أ) باستعمال مبرهنة التزايديات المنتهية بين أن :  $F(x) - \ell \geq f(x) \left(x + \frac{1}{2}\right)$  ( $\forall x \in I$ )

0,5

(ب) استنتج أن الدالة  $\tilde{F}$  غير قابلة للاشتقاق على اليمين في  $-\frac{1}{2}$

0,5